

ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Apifor 600 mg/g soluzione per alveare
Apifor 600 mg/g bee-hive solution (PT, SI)

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ogni grammo contiene:

Sostanze attive:

600 mg acido formico

Eccipiente:

Composizione qualitativa degli eccipienti e di altri costituenti
Acqua depurata

Liquido trasparente incolore.

3. INFORMAZIONI CLINICHE

3.1 Specie di destinazione

Api (*Apis mellifera*)

3.2 Indicazioni per l'uso per ciascuna specie di destinazione

Trattamento della varroasi causata dalla *Varroa destructor* nelle api (*Apis mellifera*)

3.3 Controindicazioni

Non utilizzare quando la temperatura giornaliera è al di fuori dell'intervallo specificato (10 - 30°C).

3.4 Avvertenze speciali

Usare secondo le raccomandazioni di utilizzo locali, se disponibili.

Gli alveari richiedono una ventilazione adeguata durante il trattamento.

Tutti gli alveari dello stesso apiario devono essere trattati simultaneamente per evitare il saccheggio.

Il medicinale veterinario deve essere utilizzato solo all'interno di un Piano di Lotta Integrata alla Varroa.

Si consiglia vivamente di monitorare mensilmente il livello di varroa foretica durante il periodo di covata e trattare quando i livelli aumentano.

Per garantire una sufficiente efficacia il medicinale veterinario deve essere usato quando la temperatura esterna supera i 10° C.

Piano di Lotta Integrata

L'efficacia tra le colonie può variare a causa delle condizioni d'impiego (fattori ambientali legati al luogo ed alle condizioni climatiche, temperatura, genetica e livello d'infestazione, reinfestazione, la popolosità delle api, la forza della colonia, l'area della covata, la mortalità delle api etc.). Il medicinale veterinario dovrebbe quindi essere utilizzato all'interno di un piano di lotta integrata e la caduta delle varroe essere regolarmente monitorata

3.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione:

Non trattare in presenza di melario. Non disturbare l'alveare per un minimo di 10 giorni durante il trattamento.

Temperature: La temperatura esterna ideale durante il trattamento per assicurare una buona efficacia del medicinale veterinario è compresa tra 10-30°C. Il trattamento con temperature superiori a 30°C durante i primi tre giorni di applicazione può causare una mortalità eccessiva di covata e la perdita della regina. Il trattamento deve essere rinviato fino a che le temperature scendono. Gli alveari richiedono un adeguato accesso all'aria aperta durante il trattamento. L'ingresso dell'alveare deve essere completamente aperto per tutta la durata del trattamento (min. 10 giorni). Eventuali riduttori d'ingresso devono essere rimossi per evitare danni alle colonie. Per evitare una concentrazione di acido formico intollerabile, è essenziale garantire una ventilazione sufficiente durante l'intero periodo di trattamento. Non distruggere le celle reali che possono essere osservate prima o dopo il trattamento. La sostituzione della regina anche se conseguenza del trattamento, è un processo naturale, e dovrebbe essere lasciato procedere per la salute della colonia stessa. Verificare che nella colonia sia presente l'ape regina un mese dopo il trattamento. Non è raro che dopo il trattamento siano presenti contemporaneamente sia la regina sia la figlia. Il fenomeno della "barba" può essere osservato. Le colonie dovrebbero avere buone riserve di cibo al momento del trattamento, non devono essere alimentate durante il trattamento. Controllare le riserve di cibo dopo la fine del trattamento e se necessario aggiungere del cibo.

Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Il medicinale veterinario è un liquido trasparente ed incolore, molto volatile, fortemente corrosivo e con un odore pungente. L'acido formico può causare ipersensibilità (allergia). I soggetti a conoscenza di una ipersensibilità all'acido formico dovrebbero evitare il contatto con il medicinale veterinario. Questo medicinale veterinario è irritante per la pelle, gli occhi e il tratto respiratorio. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose e l'inalazione di vapori.

Quando si maneggia il medicinale veterinario, indossare dispositivi di protezione individuale costituiti da indumenti protettivi (EN 14605), guanti resistenti alle sostanze chimiche (EN 374), occhiali protettivi (EN 166) e maschera con filtro (EN 14387). Rimuovere gli indumenti molto contaminati il prima possibile e lavarli prima di riutilizzarli. In caso di contatto accidentale sulla pelle, lavare immediatamente le aree interessate con acqua corrente, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta. In caso di contatto accidentale negli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente pulita per 10 minuti, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

In caso di inalazione accidentale spostarsi all'aria aperta. Se l'irritazione persiste dopo qualsiasi tipo di esposizione, rivolgersi a un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Tenere i bambini lontani durante l'uso del medicinale veterinario. In caso di ingestione accidentale, sciacquare immediatamente la bocca e bere molta acqua, ma NON indurre il vomito, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione e l'applicazione del medicinale veterinario.

Lavarsi le mani con acqua e sapone subito dopo l'uso.

Precauzioni speciali per la tutela dell'ambiente:

Non pertinente.

Altre precauzioni:

Questo prodotto è corrosivo. Evitare il contatto con superfici metalliche.

3.6 Eventi avversi

Api:

Molto rari (< 1 animale / 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate):	Disturbo sistemico dell'ape ^{1,2} ; Mancata accettazione della regina; Mortalità della covata;
--	---

¹ Disturbo dell'attività delle colonie

² Aumento del tasso di mortalità delle api adulte dopo il trattamento

La segnalazione degli eventi avversi è importante poiché consente il monitoraggio continuo della sicurezza di un medicinale veterinario. Le segnalazioni devono essere inviate, preferibilmente tramite

un medico veterinario, al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o all'autorità nazionale competente mediante il sistema nazionale di segnalazione. Vedere il confezionamento primario per i rispettivi recapiti.

3.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Non pertinente.

3.8 Interazione con altri medicinali e altre forme di interazione

Non usare contemporaneamente con altri acaricidi.

3.9 Vie di somministrazione e posologia

Il prodotto è da usare in alveare nel modo seguente:

Dosaggio raccomandato per volume d'arnia: 2,0 - 2,5 g di acido formico per ogni litro di volume d'arnia, pari a 3,8 - 4,8 ml di prodotto per ogni litro di volume d'arnia. Il dosaggio indicato deve essere adattato al volume dell'arnia usata. Ad esempio per un'arnia Dadant (circa 60 L sino a 90 L di volume con il melario) il dosaggio totale da usare è 228-288 ml per arnia (342-432 ml per arnia con melario).

Il quantitativo totale di medicinale veterinario per arnia deve essere adattato in base ai livelli d'infestazione, la forza della famiglia e le condizioni ambientali (temperatura e umidità).

Modalità e durata del trattamento: il medicinale veterinario viene introdotto nell'alveare con l'ausilio di dosatori idonei (evaporatori). La particolarità di questa forma di applicazione consiste nell'evaporazione continua e costante di dosi ridotte per unità di tempo per un periodo prolungato. L'evaporazione dell'acido formico nella colonia deve avvenire con la massima regolarità possibile per un periodo di tempo minimo di 10 giorni o comunque sino a completa evaporazione del prodotto. L'evaporatore va rimosso quando non c'è più acido formico nel serbatoio del dispenser. Si consiglia di utilizzare idonei applicatori/evaporatori che debbono essere collocati nella parte superiore del volume dell'arnia, così da garantire una migliore diffusione dei vapori e che siano specificamente sviluppati per l'evaporazione dell'acido formico con uno stoppino ed un sistema di evaporazione brevettato che consente un lento rilascio della soluzione acida (es. B.L.V. Formic, Nassenheider Professional).

Per usare i dispenser orizzontali, è necessario mettere un melario vuoto sull'arnia. Ciò si traduce in un aumento del volume e del dosaggio per l'alveare.

Tipo Arnia / Volume (L) per una cassa	
Langstroth (una cassa) / 44L	Dadant / 60L
Lusitana e Reversível / 54L	AZ hive / 76L

3.10 Sintomi di sovradosaggio (e, se pertinente, procedure d'emergenza e antidoti)

In caso di sovradosaggio estrarre l'evaporatore e ridurre la superficie di evaporazione. L'uso di dosi superiori a quelle raccomandate potrebbe portare ad un'eccessiva perdita di covata, alla mortalità delle api adulte, alla perdita della regina e/o sciamatura. In caso di sovradosaggio, aumentare la ventilazione dell'alveare creando ingressi supplementari dall'alto verso il basso. Verificare la presenza della regina 2 settimane dopo l'applicazione.

3.11 Restrizioni speciali per l'uso e condizioni speciali per l'impiego, comprese le restrizioni sull'uso degli antimicrobici e dei medicinali veterinari antiparassitari allo scopo di limitare il rischio di sviluppo di resistenza

Non pertinente.

3.12 Tempi di attesa

Miele: Zero giorni.

Non trattare durante il flusso di miele.

4. INFORMAZIONI FARMACOLOGICHE

4.1 Codice ATCvet: QP53AG01

4.2 Farmacodinamica

L'acido formico agisce per fumigazione, o per azione del vapore.

L'acido formico è attivo contro gli acari sulle api adulte ed è noto che uccide le ninfe degli acari all'interno delle celle di covata opercolate.

La modalità di azione dell'acido formico non è stata completamente chiarita. I dati disponibili mostrano un'inibizione della catena respiratoria mitocondriale e acidosi dei tessuti corporei. *Varroa destructor* è più suscettibile a questo meccanismo rispetto all'ape, il che spiega la selettività terapeutica.

4.3 Farmacocinetica

La farmacocinetica dell'acido formico nelle api non è stata studiata.

5. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

5.1 Incompatibilità principali

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

5.2 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 4 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

5.3 Precauzioni particolari per la conservazione

Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare in un luogo asciutto.

Conservare nel contenitore originale.

Tenere il contenitore ben chiuso in un luogo ben ventilato, lontano da acido solforico, forti agenti ossidanti (es. acido nitrico, perossidi, perclorati, cloriti) e fonti di accensione.

5.4 Natura e composizione del confezionamento primario

Flacone o tanica in polietilene ad alta densità (HDPE) bianco opaco con tappo a vite in polietilene ad alta densità;

Confezioni:

1 x Flacone da 1L

1 x Tanica da 5L

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

5.5 Precauzioni speciali per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Il medicinale veterinario non deve essere disperso nei corsi d'acqua poiché l'acido formico potrebbe essere pericoloso per i pesci o per altri organismi acquatici.

Utilizzare sistemi di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali in conformità delle norme locali e di eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato.

6. NOME DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

CHEMICALS LAIF S.P.A.

7. NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A.I.C. n° 104961014 Flacone da 1000 ml

A.I.C. n° 104961026 Tanica da 5000 ml

8. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 28/03/2017

9. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

06/2025

10. CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI VETERINARI

Medicinale veterinario non soggetto a prescrizione.

Informazioni dettagliate su questo medicinale veterinario sono disponibili nella banca dati dei medicinali dell'Unione (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary/it>).

INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO – ETICHETTA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO COMBINATI

HDPE / Flacone – HDPE / Tanica

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Apifor 600 mg/g soluzione per alveare

2. COMPOSIZIONE

Ogni grammo contiene:

Sostanza attiva:

600 mg acido formico

Eccipiente:

Acqua depurata

Liquido trasparente incolore.

3. CONFEZIONI

1L

5L

4. SPECIE DI DESTINAZIONE

Api (*Apis mellifera*)

5. INDICAZIONI PER L'USO

Indicazioni per l'uso

Trattamento della varroasi causata dalla *Varroa destructor* nelle api (*Apis mellifera*)

6. CONTROINDICAZIONI

Controindicazioni

Non utilizzare quando la temperatura giornaliera è al di fuori dell'intervallo specificato (10 - 30°C).

7. AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali

Avvertenze speciali:

Usare secondo le raccomandazioni di utilizzo locali, se disponibili.

Gli alveari richiedono una ventilazione adeguata durante il trattamento.

Tutti gli alveari dello stesso apiario devono essere trattati simultaneamente per evitare il saccheggio.

Il medicinale veterinario deve essere utilizzato solo all'interno di un Piano di Lotta Integrata alla Varroa.

Si consiglia vivamente di monitorare mensilmente il livello di varroa foretica durante il periodo di covata e trattare quando i livelli aumentano.

Per garantire una sufficiente efficacia il medicinale veterinario deve essere usato quando la temperatura esterna supera i 10° C.

Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione:

Non trattare in presenza di melario. Non disturbare l'alveare per un minimo di 10 giorni durante il trattamento.

Temperature: La temperatura esterna ideale durante il trattamento per assicurare una buona efficacia del prodotto è compresa tra 10-30°C. Il trattamento con temperature superiori a 30°C durante i primi tre giorni di applicazione può causare una mortalità eccessiva di covata e la perdita della regina. Il trattamento deve essere rinviato fino a che le temperature scendono. Gli alveari richiedono un adeguato accesso all'aria aperta durante il trattamento. L'ingresso dell'alveare deve essere completamente aperto per tutta la durata del trattamento (min. 10 giorni). Eventuali riduttori d'ingresso devono essere rimossi per evitare danni alle colonie. Per evitare una concentrazione di acido formico intollerabile, è essenziale garantire una ventilazione sufficiente durante l'intero periodo di trattamento. Non distruggere le celle reali che possono essere osservate prima o dopo il trattamento. La sostituzione della regina anche se conseguenza del trattamento, è un processo naturale, e dovrebbe essere lasciato procedere per la salute della colonia stessa. Verificare che nella colonia sia presente l'ape regina un mese dopo il trattamento. Non è raro che dopo il trattamento siano presenti contemporaneamente sia la regina sia la figlia. Il fenomeno della "barba" può essere osservato. Le colonie dovrebbero avere buone riserve di cibo al momento del trattamento, non devono essere alimentate durante il trattamento. Controllare le riserve di cibo dopo la fine del trattamento e se necessario aggiungere del cibo.

Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Il medicinale veterinario è un liquido trasparente ed incolore, molto volatile, fortemente corrosivo e con un odore pungente. L'acido formico può causare ipersensibilità (allergia). I soggetti a conoscenza di una ipersensibilità all'acido formico dovrebbero evitare il contatto con il medicinale veterinario. Questo medicinale veterinario è irritante per la pelle, gli occhi e il tratto respiratorio. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose e l'inalazione di vapori.

Quando si maneggia il medicinale veterinario, indossare dispositivi di protezione individuale costituiti da indumenti protettivi (EN 14605), guanti resistenti alle sostanze chimiche (EN 374), occhiali protettivi (EN 166) e maschera con filtro (EN 14387). Rimuovere gli indumenti molto contaminati il prima possibile e lavarli prima di riutilizzarli. In caso di contatto accidentale sulla pelle, lavare immediatamente le aree interessate con acqua corrente, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta. In caso di contatto accidentale negli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente pulita per 10 minuti, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

In caso di inalazione accidentale spostarsi all'aria aperta. Se l'irritazione persiste dopo qualsiasi tipo di esposizione, rivolgersi a un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Tenere i bambini lontani durante l'uso del prodotto. In caso di ingestione accidentale, sciacquare immediatamente la bocca e bere molta acqua, ma NON indurre il vomito, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione e l'applicazione del medicinale veterinario. Lavarsi le mani con acqua e sapone subito dopo l'uso.

Precauzioni speciali per la tutela dell'ambiente

Non pertinente.

Altre precauzioni:

Questo medicinale veterinario è corrosivo. Evitare il contatto con superfici metalliche.

Interazione con altri medicinali veterinari e altre forme di interazione:

Non usare contemporaneamente con altri acaricidi.

Sovradosaggio:

In caso di sovradosaggio estrarre l'evaporatore e ridurre la superficie di evaporazione. L'uso di dosi superiori a quelle raccomandate potrebbe portare ad un'eccessiva perdita di covata, alla mortalità delle api adulte, alla perdita della regina e/o sciamatura. In caso di sovradosaggio, aumentare la ventilazione dell'alveare creando ingressi supplementari dall'alto verso il basso. Verificare la presenza della regina 2 settimane dopo l'applicazione.

Incompatibilità principali:

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

8. EVENTI AVVERSI

Eventi avversi

Api:

Molto rari (< 1 animale / 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate):	Disturbo sistemico dell'ape (Disturbo dell'attività delle colonie; Aumento del tasso di mortalità delle api adulte dopo il trattamento); Mancata accettazione della regina; Mortalità della covata
--	--

La segnalazione degli eventi avversi è importante poiché consente il monitoraggio continuo della sicurezza di un prodotto. Se dovessero manifestarsi effetti indesiderati, compresi quelli non menzionati in questa etichetta, o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne in primo luogo il medico veterinario. È inoltre possibile segnalare eventuali eventi avversi al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio utilizzando i recapiti riportati in questa etichetta o tramite il sistema nazionale di segnalazione: <https://www.salute.gov.it/farmacovigilanzaveterinaria>

9. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIE E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Posologia per ciascuna specie, vie e modalità di somministrazione

Il prodotto è da usare in alveare nel modo seguente:

Dosaggio raccomandato per volume d'arnia: 2,0 - 2,5 g di acido formico per ogni litro di volume d'arnia, pari a 3,8 - 4,8 ml di prodotto per ogni litro di volume d'arnia. Il dosaggio indicato deve essere adattato al volume dell'arnia usata. Ad esempio per un'arnia Dadant (circa 60 L sino a 90 L di volume con il melario) il dosaggio totale da usare è 228-288 ml per arnia (342-432 ml per arnia con melario).

Il quantitativo totale di prodotto per arnia deve essere adattato in base ai livelli d'infestazione, la forza della famiglia e le condizioni ambientali (temperatura e umidità).

Modalità e durata del trattamento: il medicinale veterinario viene introdotto nell'alveare con l'ausilio di dosatori idonei (evaporatori). La particolarità di questa forma di applicazione consiste nell'evaporazione continua e costante di dosi ridotte per unità di tempo per un periodo prolungato. L'evaporazione dell'acido formico nella colonia deve avvenire con la massima regolarità possibile per un periodo di tempo minimo di 10 giorni o comunque sino a completa evaporazione del medicinale veterinario. L'evaporatore va rimosso quando non c'è più acido formico nel serbatoio del dispenser. Si consiglia di utilizzare idonei applicatori/evaporatori che debbono essere collocati nella parte superiore del volume dell'arnia, così da garantire una migliore diffusione dei vapori e che siano specificamente sviluppati per l'evaporazione dell'acido formico con uno stoppino ed un sistema di evaporazione brevettato che consente un lento rilascio della soluzione acida (es. B.L.V. Formic, Nassenheider Professional).

Per usare i dispenser orizzontali, è necessario mettere un melario vuoto sull'arnia. Ciò si traduce in un aumento del volume e del dosaggio per l'alveare.

Tipo Arnia / Volume (L) per una cassa	
Langstroth (una cassa) / 44L	Dadant / 60L
Lusitana e Reversível / 54L	AZ hive / 76L

10. RACCOMANDAZIONI PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Raccomandazioni per una corretta somministrazione

Piano di Lotta Integrata

L'efficacia tra le colonie può variare a causa delle condizioni d'impiego (fattori ambientali legati al luogo ed alle condizioni climatiche, temperatura, genetica e livello d'infestazione, reinfestazione, la popolosità delle api, la forza della colonia, l'area della covata, la mortalità delle api etc.). Il medicinale veterinario dovrebbe quindi essere utilizzato all'interno di un piano di lotta integrata e la caduta delle varroe essere regolarmente monitorata

11. TEMPI DI ATTESA

Tempi di attesa

Miele: Zero giorni.

Non trattare durante il flusso di miele.

12. PRECAUZIONI SPECIALI PER LA CONSERVAZIONE

Precauzioni speciali per la conservazione

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare in un luogo asciutto.

Conservare nel contenitore originale.

Tenere il contenitore ben chiuso in un luogo ben ventilato, lontano da acido solforico, forti agenti ossidanti (es. acido nitrico, perossidi, perclorati, cloriti) e fonti di accensione.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta dopo Exp. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

13. PRECAUZIONI SPECIALI PER LO SMALTIMENTO

Precauzioni speciali per lo smaltimento

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Questo medicinale veterinario non deve essere disperso nei corsi d'acqua poiché l'acido formico potrebbe essere pericoloso per i pesci o per altri organismi acquatici. Utilizzare sistemi di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali in conformità delle norme locali e di eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato. Queste misure servono a salvaguardare l'ambiente.

Chiedere al proprio medico veterinario o al proprio farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno.

14. CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI VETERINARI

Classificazione dei medicinali veterinari

Medicinale veterinario non soggetto a prescrizione.

15. NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E CONFEZIONI

A.I.C. n° 104961014 Flacone da 1000 ml

A.I.C. n° 104961026 Tanica da 5000 ml

Confezioni

1 x 1L

1 x 5L

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

16. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DELL'ETICHETTA
--

Data dell'ultima revisione dell'etichetta

06/2025

Informazioni dettagliate su questo medicinale veterinario sono disponibili nella Banca dati dei medicinali dell'Unione (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary/it>).

17. RECAPITI

Recapiti

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e fabbricante responsabile del rilascio dei lotti e recapiti per la segnalazione di sospetti eventi avversi:

CHEMICALS LAIF S.P.A.

Viale dell'Artigianato 13

35010 Vigonza (PD), Italy

Tel: +393880593724

qppv@chemicalslaif.it

18. ALTRE INFORMAZIONI

19. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO"
--

Solo per uso veterinario.

20. DATA DI SCADENZA

Exp. {mm/aaaa}

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 3 mesi

21. NUMERO DI LOTTO

Lotto {numero}